

نحوه پرورش و نگهداری بلدرچین چگونه است؟

شيوه پرورش، نوع تغذيه و نگهداری بلدرچين شبیه مرغ است و بایستی قفسها و وسائل مورد استفاده با نگهداری بلدرچين هماهنگ شود.

پرورش و نگهداری بلدرچين به عنوان يکي از گونه‌هاي مهم طیور مدتی است در کشورمان متداول شده و به تدریج محصولات آن جاي خود را در سبد غذايي خانواده‌ها باز کرده است. بلدرچين در طول دوره پرورش زودتر از مرغ به سن بلوغ ميرسد و انواع اصالح شده آن میتواند به تعداد مرغ تخمگذاري کند. بلدرچينها پرندگانى نيرومند و پربافت هستند و از همين رو پرورش و نگهداری آنها در محيطهای مختلف امکان پذير است. اين پرندگان کوچک خود را به سرعت به شرایط محیط آدایته میکنند و سریع رشد کرده و در زمان ۶ هفته به بلوغ ميرسند.

نحوه پرورش و نگهداری بلدرچين

برای نگهداری از بلدرچين لازم است قبل از هر چيز با شرایط زندگی (دما و نور مورد نیاز محیط)، نوع تغذيه، انتخاب بلدرچين مادر و نحوه توليد مثل و تخمگذاری اين پرنده آشنا شويد:

• تغذيه بلدرچين

تغذيه بلدرچين مثل تغذيه مرغهاست. ميزان و نوع اين تغذيه، بسته به سن پرنده متغير است. طبقه بندی دوران زندگی بلدرچين بسته به ميزان رشد و تظاهر توليدشان به مرحله شروع کننده (صفر تا ۳ هفتگی)، در حال رشد یا رشد کننده (۴ تا ۵ هفتگی) و بلدرچين تخم گذار یا مادر (۶ هفتگی به بعد) تقسيم ميشود.

ميزان تغذيه بلدرچين (صفر تا ۳ هفتگی): برای ۳ تا ۴ هفته اول بلدرچين ها را بایستی از يك جيره غذايي محتوي تقريباً ۲۷ درصد پروتئين و در حدود ۲،۷۵۰ کيلوکالري بر کيلوگرم انرژی تغذيه نمود.

ميزان تغذيه بلدرچين (۴ تا ۵ هفتگی): در اين مرحله، بایستی از يك جيره غذائي با داشتن ۲۴ درصد پروتئين استفاده نمود.

تغذيه بلدرچين مادر (۶ هفتگی به بعد): با ارزش غذايي معادل ۲،۶۵۰ کيلو کالري بر کيلوگرم تغذيه نمود.

• درجه حرارت مورد نیاز بلدرچين ها

در روزهاي نخستين تولد جوجه های بلدرچين، دماي ۳۶ تا ۳۸ درجه سانتیگراد توام با هوای تمیز و سرشار از اکسیژن از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. بتدریج با افزایش سن جوجه ها از میزان حرارت محیط کاسته می شود و در سن ۶ تا ۷ هفتگی به ۲۲ تا ۲۴ درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

• میزان نور مورد نیاز برای نگهداری بلدرچين

شدت نور در امر پرورش و نگهداری بلدرچين از اهمیت زیادی برخوردار است. در زمان تولد جوجه‌ها، شدت نور زیاد (۶۰ تا ۷۰ لوکس) لازم است و در هفته سوم به ۱۰ لوکس ميرسد. هنگامی که میزان نور کاملاً کنترل ميشود، می توان به پرندگان ۲۳ ساعت در روز روشنایی داد و بهتر این است که از سن يك روزگی يك ساعت در شبانه روز تاریکی در نظر بگیرید و آنها را به تاریکی احتمالی عادت بدهید تا در صورت بوجود آمدن تاریکی در ارتباط با خاموشي برق اشکالي پیش نیاید. جالب است بدانید جهت دستیابی به حداکثر میزان تخم بلدرچين، ۱۴ تا ۱۶ ساعت روشنایی مورد نیاز است.

• انتخاب بلدرچین مادر

انتخاب بلدرچین های مادر معمولاً بر اساس بازرسی، وزن و شرایط بهداشتی صورت می گیرد. لازم است بلدرچین های مادر در شرایط خوبی از نظر سلامت، توان تخمگذاری زیاد، قابلیت زنده ماندن و قابلیت هچ شدن خوب باشند.

• تولید مثل بلدرچین

بلدرچین های اهلی در تمام فصول سال و در سن ۱۰ تا ۲۰ هفته تولید مثل (تخمگذاری) می نمایند. یک بلدرچین ماده هر ۱۶ تا ۲۴ ساعت و برای مدت ۸ تا ۱۲ ماه تخم می گذارد. تخمها بایستی برای هچ شدن ۴ روز بعد از وارد کردن نرها (یک نر برای ۳ ماده) و تا ۳ روز بعد از اینکه جنس های نر و ماده از هم جدا شدند، جمع آوری گردند. وزن متوسط تخم بلدرچین، حدود ۱۰ گرم است.

جالب است بدانید، مرغها در حدود ۷۵ درصد از تخمهایشان را به هنگام صبح می گذارند در حالیکه بلدرچین، ۷۵ درصد تخم روزانه خود را در ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر می گذارد. همچنین نگهداری بلدرچین در نور مداوم به میزان بالایی از تولید تخم به هنگام سال اول و با رسیدن تولید به مرحله توقف در پایان سال دوم می انجامد



مرکز اطلاع رسانی طیور ایران

www.bankpoultry.ir

<https://t.me/bankpoultry>